

SANTÉ CANADA A ACCORDÉ UNE EXCEPTION TEMPORAIRE POUR L'IMPORTATION D'UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE SUSPENSIONS D'ACÉTAMINOPHÈNE GENEXA POUR LES ENFANTS. VEUILLEZ UTILISER CET AVIS POUR UNE VERSION FRANÇAISE DE L'EMBALLAGE DE CES PRODUITS IMPORTÉS

Genexa®

UNE MÉDECINE PROPRE



De 2 à 11 ans

Douleur et fièvre d'enfant

Acétaminophène

160 mg par 5 mL | Suspension orale

Analgésique

Réducteur de fièvre




☼ Une médecine propre

Mêmes ingrédients actifs,
mais **sans agents artificiels.**

Saveur de bleuets
biologiques



4 fl oz (118 mL)  Gobelet doseur inclus

Brevet en instance | Distribué par : Genexa Inc.
Atlanta, GA 30324 | genexa.com



Numérisez pour voir la
version française de
l'emballage en
version électronique.

Nous espérons
que vous vous
sentirez mieux

BIEN AGITER
avant chaque utilisation

La bouteille est scellée en toute
sécurité avec une bande perforée
autour de la bouteille. NE PAS
utiliser si le sceau de la bouteille est
endommagé ou manquant.



Fabriqué aux États-Unis
avec des ingrédients
d'origine mondiale

Au verso →

Info-médicament

Ingrédient actif (par 5 mL)

Acétaminophène 160 mg

Utilité

Analgésique/
antipyrétique

Usages

Réduit temporairement la fièvre et soulage les douleurs mineures dues à

- Le rhume
- La grippe
- Le mal de tête
- Le mal de gorge
- Le mal de dents

Mises en garde

Avertissement sur le foie : Ce produit contient de l'acétaminophène.

Des dommages graves au foie peuvent survenir si votre enfant prend

- plus de 5 doses en 24 heures, ce qui est la quantité quotidienne maximale
- avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène

Alerte aux allergies : l'acétaminophène peut causer des réactions cutanées graves.

Les symptômes peuvent inclure :

- rougeur de la peau
- cloques
- éruption cutanée

Si une réaction cutanée se produit, cesser l'utilisation et consulter immédiatement un médecin.

Avertissement de mal de gorge : si le mal de gorge est grave, persiste pendant plus de 2 jours, est accompagné ou suivi de fièvre, de maux de tête, d'éruption cutanée, de nausées ou de vomissements, consultez rapidement un médecin.

Ne pas utiliser avec un autre médicament contenant de l'acétaminophène (sur ordonnance ou en vente libre). Si vous n'êtes pas certain qu'un médicament contient de l'acétaminophène, demandez à un médecin ou à un pharmacien.

Consulter un médecin avant d'utiliser si votre enfant a une maladie du foie

Demandez à un médecin ou à un pharmacien avant utilisation si votre enfant prend le médicament anticoagulant warfarine

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si

- la douleur s'aggrave ou dure plus de 5 jours
 - la fièvre s'aggrave ou dure plus de 3 jours
 - de nouveaux symptômes apparaissent
 - une rougeur ou un gonflement est présent
- Ceux-ci pourraient être des signes d'une maladie grave.

Garder hors de la portée des enfants.

En cas de surdose, consultez un médecin ou communiquez immédiatement avec un centre antipoison. Des soins médicaux rapides sont essentiels même si vous ne remarquez aucun signe ou symptôme.



Les gens d'abord.

Nous pensons que vous ne devriez pas avoir à faire de compromis entre ce qui vous fait vous sentir mieux et ce qui a de mieux pour vous. C'est pourquoi nous fabriquons des médicaments avec les ingrédients actifs dont vous avez besoin, mais sans les ingrédients artificiels. C'est ce que vous méritez.

David Johnson

Max Spielberg

Info-médicament (suite)

Mode d'emploi

- **Ce produit ne contient pas de mode d'emploi ou d'avertissements complets pour une utilisation pour adulte**
- **Ne donnez pas plus que ce qui est indiqué (voir avertissement Surdose)**
- **BIEN AGITER AVANT UTILISATION**
- Trouvez la bonne dose dans le tableau ci-dessous
- Pour un dosage précis, utilisez le gobelet doseur inclus. Ne pas utiliser avec un autre dispositif de dosage
- Administrer la dose toutes les 4 heures jusqu'à la fin des symptômes
- Si possible, utilisez le poids pour doser, sinon, utilisez l'âge
- Ne pas dépasser 5 doses par 24 heures

Poids	Âge	Dose
Moins de 24 lb.	Moins de 2 ans	Consulter un médecin
24-35 lb	2-3 ans	5 mL
36-47 lb	4-5 ans	7,5 mL
48-59 lb	6-8 ans	10 mL
60-71 lb	9-10 ans	12,5 mL
72-95 lb	11 ans	15 mL

Autres informations

Conservé entre 20 et 25 °C (68-77 °F)

Ingrédients inactifs

Sirop d'agave biologique, arôme de myrtille biologique, extrait naturel d'agrumes, arôme naturel, eau purifiée

Questions? Pour un service en français, courriel: quality@genexa.com
For English, email: quality@genexa.com or call 1-855-436-3921